



## FOLYÉKONY PEKTINBONTÓ ENZIMKÉSZÍTMÉNY

### ZIMOPEC AR

*Aspergillus niger* gomba törzséből nyert folyékony pektinbontó enzimek készítmény arabináz kiválasztó mellékhatással.

A ZIMOPEC AR használata alma- és körtelevek kezeléséhez javasolt.

#### A léderítési eljárásoknál

A ZIMOPEC AR termék használata a levek derítési fázisában javasolt.

Alkalmazásával – különösen a nagy nyomású préselés esetén lép fel nagy pektintartalom –, érhető el a lében lévő pektin és arabináz lebontása, melyek elsősorban felelősek a zavarosság jelenségéért, főként a tömény levek esetében.

#### A szűrés optimalizálása

A ZIMOPEC AR és az AM együttes használata tökéletesíti a szűrést oly módon, hogy a szűrőeltömődését okozó nem kellően

hidrolizált makromolekulákat lebontja, a pektint, arabinázt.

#### Az alkalmazás gyakorlati haszna

A folyékony ZIMOPEC AR felhasználása nagy könnyebbséget és biztonságot jelent a por alakú formához képest.

#### Technológiai jellemzők:

Halmazállapot:	folyékony
Szag:	típusos
Szín:	barna

---

#### Adagolás:

Meleg derítéshez: 1,5–3 g/hl 40–50 °C-on, 30–60 percig.

Hideg derítéshez: 2–5 g/hl 20–30 °C-on, 1–3 óráig.

#### Alkalmazás:

Tanácsos előbb vízben feloldani a készítményt (arány 1:10), és a teljesen elkevert oldatot hozzáadni a kezelendő anyaghoz. Legalább 1–3 órás időt igényel a kezelés.

#### Összetétel:

*Aspergillus niger* gomba törzséből nyert pektinbontó főhatású és arabináz kiválasztó másodlagos hatású folyékony enzimek készítmény.

#### Tárolás:

Eredeti csomagolásban, 4 °C-on 3 évig megőrzi minőségét (egy év alatt kevesebb, mint 10%-ot veszít súlyából).

#### Kiszerezés:

25 kg-os kanna.